

VIDAL DE LA FAMILLE

DAFLON

Fiche révisée le : 16/07/2019

Vasculoprotecteur et veinotonique

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p cp	p cp
Fractions flavonoïques purifiées	500 mg	1000 mg
soit Diosmine	450 mg	900 mg
soit Hespéridine	50 mg	100 mg

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est un [veinotonique](#) et un protecteur [vasculaire](#). Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des [vaisseaux capillaires](#).

Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

- des jambes lourdes, [impatiences](#) et autres troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou [lymphatique](#) (comprimé à 500 mg) ;
- des crises d'[hémorroïdes](#) (comprimés à 500 mg et 1000 mg).

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de [phlébite](#) chez les malades alités ou plâtrés.

Le traitement de l'[insuffisance veineuse](#) repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.

Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des [hémorroïdes](#) et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Allaitement :

Ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau au moment des repas.

Posologie usuelle:

[Insuffisance veineuse](#) : 1 comprimé à 500 mg, midi et soir.

Crise d'[hémorroïdes](#) : 6 comprimés à 500 mg ou 3 comprimés à 1000 mg par jour les 4 premiers jours, puis 4 comprimés à 500 mg ou 2 comprimés à 1000 mg par jour pendant 3 jours.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et [lymphatique](#).

La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'[hémorroïdes](#). Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Fréquents : diarrhée, digestion difficile, nausée, vomissement.

Peu fréquents : inflammation du côlon.

Rares : sensations vertigineuses, maux de tête, malaise, démangeaisons, éruption cutanée, urticaire.

Exceptionnellement : gonflement isolé du visage, des paupières ou des lèvres, œdème de [Quincke](#).

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)***hémorroïdes***

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

impatiences

Sensations pénibles localisées dans les jambes. Elles se manifestent, généralement lors du coucher, par un sentiment d'inconfort, un besoin irrésistible de bouger les jambes.

insuffisance veineuse

Incapacité des veines des jambes à faire remonter le sang vers le cœur.

lymphatique

Qui concerne la lymphe, liquide incolore circulant dans des vaisseaux spécifiques et dont l'accumulation provoque des œdèmes.

phlébite

Inflammation d'une veine profonde avec formation d'un caillot sanguin, touchant généralement les jambes. La gravité des phlébites est liée à la possibilité d'un déplacement du caillot qui peut migrer jusqu'au cœur et venir ensuite obstruer une artère des poumons (embolie pulmonaire). Une paraphlébite, ou phlébite superficielle, est l'inflammation d'une veine superficielle ; elle est beaucoup moins préoccupante.

Quincke

œdème de Réaction allergique touchant généralement le visage. L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement parfois spectaculaire. Les paupières sont souvent les premières touchées. Dans les rares cas où l'œdème touche la gorge, des troubles respiratoires peuvent survenir et un traitement urgent est nécessaire.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

vaisseaux capillaires

Vaisseaux sanguins plus fins que des cheveux (d'où leur nom) qui irriguent les cellules.

vasculaire

Qui concerne les vaisseaux sanguins : artères et veines.

veinotonique

Désigne un médicament qui a la propriété d'augmenter le tonus de la paroi.