

VIDAL DE LA FAMILLE

DOLODENT

Fiche révisée le : 12/06/2012

Préparation buccale antalgique

amyléine

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Amyléine chlorhydrate	0,75 g

INDICATIONS

Cette solution gingivale contient un [anesthésique](#) d'action locale.

Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des poussées dentaires chez le jeune enfant.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux [anesthésiques](#) locaux.

ATTENTION

Certains [symptômes](#) sont fréquemment attribués à une poussée dentaire : rougeurs des fesses ou des joues, selles molles, fièvre.

Cependant, si la fièvre est élevée ou si la douleur est importante, une autre affection est possible, notamment une [otite](#) ou une angine : n'hésitez pas à consulter votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Mettre un peu de solution sur un doigt et masser doucement les gencives pendant 2 à 3 minutes.

Posologie usuelle:

2 ou 3 applications par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 5 jours sans avis médical.

CONSEILS

Les premières dents sortent habituellement aux environs du 6e mois ; cependant, les poussées peuvent être plus précoces ou plus tardives (entre le 3e et le 15e mois) sans que cela soit anormal.

Lors des poussées dentaires, certains enfants peuvent refuser les aliments solides, ce phénomène est passager et ne doit pas vous

inquiéter. D'autres enfants sont soulagés par le fait de mordre : une tétine ou un bâton de guimauve peuvent les apaiser.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

[Réaction allergique.](#)

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

anesthésique

Médicament qui entraîne une anesthésie. Outre les anesthésiques généraux qui permettent d'endormir les malades avant une opération, il existe des anesthésiques locaux, qui peuvent être injectés au contact d'un nerf pour insensibiliser une région du corps. Les anesthésiques locaux sont également appelés anesthésiques de contact.

otite

Inflammation ou infection de l'oreille. L'otite externe ne concerne que le conduit auditif. L'otite moyenne aiguë et l'otite séreuse chronique touchent la partie de l'oreille située derrière le tympan (oreille moyenne).

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.