

# VIDAL DE LA FAMILLE

## HÉLICIDINE

Fiche révisée le : 11/10/2022

### Antitussif

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p c à c	p c à s
Hélicidine	0,5 ml	1,5 ml
Maltitol liquide	+	+
Parahydroxybenzoate de méthyle	+	+

### INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament contient une protéine extraite de l'escargot. Il a une action sédatrice sur la toux. Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des toux sèches.

### CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie alimentaire aux escargots,
- allergie aux parabens,
- enfant de moins de 2 ans.

### ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Ce sirop n'est pas adapté au traitement de la toux grasse, qui est un mécanisme de défense normal de l'organisme permettant l'évacuation des mucosités présentes dans les bronches.

La toux est un [symptôme](#) qui peut révéler de nombreuses maladies : consultez votre médecin si elle persiste plus de quelques jours. Ce médicament peut contenir des traces de tropomyosine. des précautions sont nécessaires en cas d'allergie aux acariens, à la blatte

ou aux crustacés du fait d'une possible réaction croisée.

## **GROSSESSE et ALLAITEMENT** ([sommaire](#))

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE** ([sommaire](#))

Les prises de ce médicament doivent être réparties au cours de la journée, au moment où survient la toux.

### **Posologie usuelle:**

- Adulte : 2 cuillères à soupe, 3 fois par jour.
- Enfant de 25 à 50 kg (environ 8 à 15 ans) : 3 à 5 cuillères à soupe par jour.
- Enfant de 15 à 25 kg (environ 4 à 8 ans) : 1 cuillère à soupe, 3 fois par jour.
- Enfant de 12 à 15 kg (environ 2 à 4 ans) : 2 cuillères à café, 3 fois par jour.

## **CONSEILS** ([sommaire](#))

Des mesures simples permettent de calmer les toux sèches : boissons chaudes et humidification de l'air ambiant.  
La cigarette est irritante pour les bronches et entretient la toux : évitez de fumer ou d'être exposé à la fumée des autres.  
Le sirop ne doit pas être conservé plus de 6 mois après ouverture du flacon. Pensez à noter la date de première utilisation sur l'emballage.

## **EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES** ([sommaire](#))

Fréquence indéterminée : [réaction allergique](#) (urticaire, démangeaisons, éruption cutanée, œdème de Quincke, choc anaphylactique).

---

## **LEXIQUE** ([sommaire](#))

### ***réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### ***symptôme***

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

### ***traitement symptomatique***

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.