

VIDAL DE LA FAMILLE

HEXTRIL bain de bouche

Fiche révisée le : 10/03/2023

Bain de bouche antiseptique

hexétidine

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 15 ml	p 15 ml
Hexétidine	15 mg	15 mg
Alcool	+	+
Azorubine	+	

INDICATIONS

Cette solution pour [bain de bouche](#) contient un [antiseptique](#).
Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des affections de la bouche ou des suites d'opération des gencives ou des dents.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 6 ans.

ATTENTION

L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux ([gargarisme](#), [collutoire](#), pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

Ce médicament contient des [terpènes](#) (présence de menthol) qui peuvent, en cas de dépassement des [posologies](#), avoir des effets indésirables graves : respectez les doses préconisées, plus particulièrement chez l'enfant ou en cas d'[épilepsie](#).

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

En raison de la présence d'alcool, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution peut être utilisée pure ou diluée au demi s'il apparaît une sensation douloureuse. Pour obtenir une dilution au demi, verser la solution jusqu'au premier trait du gobelet et compléter avec de l'eau jusqu'en haut.

Pour chaque [bain de bouche](#), utiliser le contenu d'un gobelet doseur. La solution est gardée dans la bouche 30 secondes environ avant d'être recrachée. Elle ne doit pas être avalée.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 2 ou 3 bains de bouche par jour.

CONSEILS

Évitez de manger ou de boire dans l'heure qui suit le [bain de bouche](#).

Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bain de bouche dans les heures qui suivent une extraction dentaire afin d'éviter de faire saigner la plaie.

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation locale, coloration anormale de la langue ou des dents, aphtes, troubles du goût, nausées, vomissements, difficulté à avaler, bouche sèche, [réaction allergique](#).

En raison de la présence de [terpènes](#) (menthol) et en cas de dépassement de la [posologie](#) usuelle : risque de [convulsions](#) chez l'enfant et d'agitation et de confusion chez la personne âgée.

LEXIQUE

antiseptique

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

bain de bouche

Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède.

collutoire

Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.

convulsions

Contractions involontaires limitées à quelques muscles ou généralisées à tout le corps. Elles sont dues à une souffrance ou à une stimulation excessive du cerveau : fièvre, intoxication, manque d'oxygène, lésion du cerveau. Les convulsions peuvent être dues à une crise d'épilepsie ou à une fièvre élevée chez le jeune enfant.

épilepsie

Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.

gargarisme

Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée ne doit pas être avalée.

posologies

Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.

réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

terpènes

Terme général désignant des substances aromatiques d'origine végétale. Celles-ci sont traditionnellement utilisées pour leurs propriétés respiratoires (stimulante, expectorante, antiseptique) et leur pouvoir révulsif en cas d'application sur la peau. Les plus utilisées sont le camphre, le menthol, l'eucalyptol, les huiles essentielles de menthe, de térébenthine, de niaouli, de pin, d'anis, etc.

Certains terpènes, et surtout le camphre, ont été responsables de convulsions, de pauses respiratoires chez le nourrisson, en cas de surdosage. Ils peuvent également provoquer des troubles du comportement chez la personne âgée. Ces produits doivent être utilisés avec prudence aux âges extrêmes de la vie.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.