

# VIDAL DE LA FAMILLE

## MÉDIVEINE

Fiche révisée le : 13/09/2019

### Vasculoprotecteur et veinotonique

diosmine

**Ce médicament est un générique de DIOVENOR**

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)  
[Lexique](#)

## COMPOSITION

	p cp	p cp
Diosmine	300 mg	600 mg
Lactose	+	+

## INDICATIONS

Ce médicament est un protecteur [vasculaire](#) et un [veinotonique](#). Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des [vaisseaux capillaires](#).

Il est utilisé dans :

- le [traitement symptomatique](#) des troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou [lymphatique](#) : jambes lourdes, [impatiences](#) ;
- le traitement d'appoint de la fragilité des petits vaisseaux sous-cutanés se traduisant par des taches rouges ou violacées ;
- le traitement des crises d'[hémorroïdes](#).

## ATTENTION

Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de [phlébite](#) chez les malades alités ou plâtrés.

Le traitement de l'[insuffisance veineuse](#) repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.

Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des [hémorroïdes](#) et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

### Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

### Allaitement :

Ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament doit être pris au moment des repas.

### Posologie usuelle:

[Insuffisance veineuse](#) : 1 comprimé à 300 mg, midi et soir ou 1 comprimé à 600 mg, le matin au petit déjeuner.

Crise d'[hémorroïdes](#) : 4 à 6 comprimés à 300 mg ou 2 à 3 comprimés à 600 mg par jour par jour.

## CONSEILS

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et [lymphatique](#).

La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'[hémorroïdes](#). Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Rarement : [troubles digestifs](#).

---

## LEXIQUE

### ***hémorroïdes***

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

### ***impatiences***

Sensations pénibles localisées dans les jambes. Elles se manifestent, généralement lors du coucher, par un sentiment d'inconfort, un besoin irrépressible de bouger les jambes.

### ***insuffisance veineuse***

Incapacité des veines des jambes à faire remonter le sang vers le cœur.

### ***lymphatique***

Qui concerne la lymphe, liquide incolore circulant dans des vaisseaux spécifiques et dont l'accumulation provoque des œdèmes.

### ***phlébite***

Inflammation d'une veine profonde avec formation d'un caillot sanguin, touchant généralement les jambes. La gravité des phlébites est liée à la possibilité d'un déplacement du caillot qui peut migrer jusqu'au cœur et venir ensuite obstruer une artère des poumons (embolie pulmonaire). Une paraphlébite, ou phlébite superficielle, est l'inflammation d'une veine superficielle ; elle est beaucoup moins préoccupante.

### ***traitement symptomatique***

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

### ***troubles digestifs***

Ensemble de symptômes traduisant une irritation ou un mauvais fonctionnement du tube digestif. Un ou plusieurs troubles peuvent être présents : nausées, vomissements, aérophagie, douleurs abdominales, brûlures d'estomac, ballonnements, flatulences, diarrhée ou constipation, etc. Les antibiotiques peuvent favoriser les candidoses, souvent responsables de troubles digestifs.

### ***vaisseaux capillaires***

Vaisseaux sanguins plus fins que des cheveux (d'où leur nom) qui irriguent les cellules.

***vasculaire***

Qui concerne les vaisseaux sanguins : artères et veines.

***veinotonique***

Désigne un médicament qui a la propriété d'augmenter le tonus de la paroi.