

# VIDAL DE LA FAMILLE

## ONCTOSE

Fiche révisée le : 01/08/2006

### Antiprurigineux local

méfénidramium , lidocaïne

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)  
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

## COMPOSITION

	p 100 g
Méfénidramium méthylsulfate	2 g
Lidocaïne chlorhydrate	1 g

## INDICATIONS

Cette crème contient un [antihistaminique](#) antiallergique et un [anesthésique](#) local.  
Elle est utilisée dans le [traitement symptomatique](#) des démangeaisons dues aux piqûres d'insectes.

## CONTRE-INDICATIONS

Cette crème ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :

- [allergie](#) aux [antihistaminiques](#) ou aux [anesthésiques](#) locaux,
- lésion suintante, infectée ou irritée.

## ATTENTION

Si les démangeaisons persistent ou s'aggravent, elles peuvent être dues à une [allergie](#) à l'[antihistaminique](#) : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Évitez d'utiliser cette crème, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces de peau étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Sportif : les [anesthésiques](#) locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer la crème en massant légèrement.

### Posologie usuelle:

2 à 3 applications par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 8 jours sans avis médical.

## CONSEILS

Pensez à vous laver les mains après l'application pour éviter tout contact avec les yeux et les [muqueuses](#).

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

[Réaction allergique](#) cutanée.

[Mydriase](#), en cas d'application à proximité des yeux.

---

## LEXIQUE

### **allergie**

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### **anesthésique**

Médicament qui entraîne une anesthésie. Outre les anesthésiques généraux qui permettent d'endormir les malades avant une opération, il existe des anesthésiques locaux, qui peuvent être injectés au contact d'un nerf pour insensibiliser une région du corps. Les anesthésiques locaux sont également appelés anesthésiques de contact.

### **antihistaminique**

Médicament qui s'oppose aux différents effets de l'histamine. Deux types principaux existent : les antihistaminiques de type H1 (antiallergiques) et les antihistaminiques de type H2 (antiulcéreux gastriques). Certains antihistaminiques de type H1 sont sédatifs, d'autres n'altèrent pas la vigilance.

### **muqueuses**

Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).

### **Mydriase**

Augmentation anormale du diamètre de la pupille de l'œil qui ne réagit plus à la lumière et reste dilatée. Cet état provient d'une anomalie de l'œil ou de la prise de certains médicaments (atropiniques, etc.).

### **Réaction allergique**

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

### **traitement symptomatique**

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.