

# VIDAL DE LA FAMILLE

## PHOLCONES BISMUTH

Fiche révisée le : 12/05/2020

### Décongestionnant

guaïfénésine, cinéole, bismuth

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	p suppos Ad
Guaïfénésine	200 mg
Cinéole (eucalyptol)	120 mg
Bismuth sous-succinate	80 mg

### INDICATIONS

Ce médicament contient un [terpène](#) (eucalyptol), traditionnellement utilisé comme [antiseptique](#) des [voies](#) respiratoires, et du bismuth. Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) des affections de la gorge.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[insuffisance rénale](#).

### ATTENTION

Ce médicament contient un [terpène](#) (eucalyptol) qui peut, en cas de dépassement des [posologies](#), avoir des effets indésirables graves : respectez les doses préconisées, plus particulièrement en cas d'[épilepsie](#).  
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

#### Grossesse :

En l'absence de données suffisantes, ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

#### Allaitement :

Les [terpènes](#) peuvent donner un goût particulier au lait. Leur absorption par le [nourrisson](#) n'est pas souhaitable : évitez d'employer ce médicament pendant l'allaitement.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

- Adulte : 1 suppositoire Adulte, 1 à 3 fois par jour.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Liés à la guaïfénésine : douleurs d'estomac, nausées, vomissements.

En cas de dépassement de la [posologie](#) usuelle, les [terpènes](#) peuvent provoquer agitation et confusion des idées chez la personne âgée.

---

## LEXIQUE

### *antiseptique*

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

### *épilepsie*

Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.

### *insuffisance rénale*

Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.

### *nourrisson*

Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.

### *posologies*

Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.

### *terpène*

Terme général désignant des substances aromatiques d'origine végétale. Celles-ci sont traditionnellement utilisées pour leurs propriétés respiratoires (stimulante, expectorante, antiseptique) et leur pouvoir révulsif en cas d'application sur la peau. Les plus utilisées sont le camphre, le menthol, l'eucalyptol, les huiles essentielles de menthe, de térébenthine, de niaouli, de pin, d'anis, etc.

Certains terpènes, et surtout le camphre, ont été responsables de convulsions, de pauses respiratoires chez le nourrisson, en cas de surdosage. Ils peuvent également provoquer des troubles du comportement chez la personne âgée. Ces produits doivent être utilisés avec prudence aux âges extrêmes de la vie.

### *traitement d'appoint*

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

### *voies*

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.