

# VIDAL DE LA FAMILLE

## RECTOPANBILINE

Fiche révisée le : 09/04/2013

### Laxatif par voie rectale

extrait de bile

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#)  
[Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	p suppos
Extrait de fluide biliaire titré à 12,86 % en acide cholique	700 mg
Extrait de bile de bœuf titré à 45 % en acide cholique	200 mg

### INDICATIONS

Ce médicament est un laxatif administré par [voie](#) rectale. Il déclenche une contraction du rectum qui permet l'évacuation des selles. Il est utilisé dans le traitement de la constipation, notamment lorsque les selles s'accumulent dans le rectum et que les poussées répétées ne permettent pas de les évacuer. Il est également utilisé pour préparer le rectum avant un examen endoscopique (rectoscopie).

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans, sauf avis médical contraire.

### ATTENTION

Les laxatifs administrés par [voie](#) rectale ne doivent pas être utilisés de façon prolongée sans avis médical : ils risquent d'empêcher le réflexe normal d'expulsion des selles.

Des précautions sont nécessaires chez la personne atteinte d'[hémorroïdes](#), de [fissure anale](#) ou de [rectocolite hémorragique](#).

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament peut être utilisé de façon ponctuelle pour traiter la constipation de la femme enceinte ou qui allaite.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

L'effet laxatif se manifeste dans un délai de 5 à 30 minutes après introduction du suppositoire dans le rectum.

**Posologie usuelle:**

- Adulte : 1 suppositoire par jour.

**CONSEILS**

Le traitement de la constipation repose essentiellement sur des mesures hygiéno-diététiques : alimentation riche en fibres, eau de boisson riche en magnésium, activité physique régulière et amélioration de la position sur les toilettes.

**EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES**

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des [inflammations](#) du rectum.

---

**LEXIQUE*****fissure anale***

Petite crevasse du pourtour de l'anus, souvent peu ou pas visible, provoquant des douleurs vives pendant et après la selle.

***hémorroïdes***

Dilatation anormale d'une veine de l'anus ou du rectum se développant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Elle peut être à l'origine d'un saignement.

***inflammations***

Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.

***rectocolite hémorragique***

Maladie inflammatoire du rectum et du côlon, qui évolue par poussées. Chaque poussée s'accompagne de fièvre, de selles glaireuses et sanglantes.

***voie***

- Chemin (voie d'administration) utilisé pour administrer les médicaments : voie orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intradermique, transdermique.
- Ensemble d'organes creux permettant le passage de l'air (voies respiratoires), des aliments (voies digestives), des urines (voies urinaires), de la bile (voies biliaires), etc.