

VIDAL DE LA FAMILLE

RHINOTROPHYL

Fiche révisée le : 15/02/2018

Préparation nasale antibactérienne

acide ténoïque

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 ml
Acide ténoïque sel d'éthanolamine	3 g
Parabens	+

INDICATIONS

Cette solution nasale contient un dérivé soufré à visée [antiseptique](#) et décongestionnante.
Elle est utilisée comme [traitement d'appoint](#) des [rhinopharyngites](#).

ATTENTION

L'usage prolongé de ce médicament n'est pas souhaitable. En l'absence d'amélioration après quelques jours de traitement ou en cas de fièvre, consultez votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les pulvérisations sont faites au cours d'une brève inspiration, après un mouchage soigneux, en tenant le flacon verticalement.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 pulvérisation dans chaque narine, 4 à 6 fois par jour.
- Enfant de plus de 30 mois : 1 pulvérisation dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour.
- Nourrisson : 1 pulvérisation dans chaque narine, 2 fois par jour.

CONSEILS

Les solutions nasales [antiseptiques](#) ou [antibiotiques](#) peuvent être contaminées par des [germes](#) : ne les conservez pas au-delà de la durée du traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation locale.

[Réaction allergique](#) : rougeur, urticaire.

LEXIQUE

antibiotiques

Substance capable de bloquer la multiplication de certaines bactéries ou de les tuer. Le spectre d'un antibiotique est l'ensemble des bactéries sur lesquelles ce produit est habituellement actif. Contrairement aux bactéries, les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Les premiers antibiotiques furent extraits de cultures de champignons : penicillium (pénicilline), streptomyces (streptomycine). Ils sont actuellement fabriqués par synthèse chimique. Les antibiotiques sont divisés en familles : pénicillines, céphalosporines, macrolides, tétracyclines (cyclines), sulfamides, aminosides, lincosanides, phénicolés, polymyxines, quinolones, imidazolés, etc.

Un usage inapproprié des antibiotiques peut favoriser l'apparition de résistances : n'utilisez un antibiotique que sur prescription médicale, respectez sa posologie et sa durée, ne donnez pas et ne conseillez pas à une autre personne un antibiotique que l'on vous a prescrit.

antiseptique

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

germes

Terme général qui désigne tous les organismes microscopiques susceptibles de provoquer une infection : bactéries, virus, parasites, champignons.

Réaction allergique

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

rhinopharyngites

Inflammation de la partie haute du pharynx, située en arrière du nez et au-dessus du voile du palais. Son origine peut être virale ou bactérienne.

traitement d'appoint

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.